Programme Aubergines





*Possibilité de remplacer une des deux applications de Fertisain par 200g de soufre

Traitements compatibles en 1 seul passage Solsain Plantsain 5cL/10L 20cL/10L Par avant plantation (ne pas arrosage

dépasser la dose)

Fertisain: 3L/ha 2 fois par semaine dans le spectre de l'Oïdium 5L/ha 1 fois par semaine si pas d'Oïdium

Limosain: 5L/ha 2 fois par semaine. 10L/ha au premier ravageur

Pépinière

1 semaine

† Inoculation Désinfection

Semaine

Si problèmes récurrents d'insectes / vers du sol : Désinfection Tapis Vers : 20L/ha

En cas de problèmes fongiques récurrents : Désinfection Fongique Plantsain: 20L/ha

+ Inoculation de *Trichoderma* après désinfection Solsain 20L/ha

<u>Plantsain</u> 5L/ha à la floraison / débâchage

Si maladies du sol Plantsain 10L/ha /semaine Sinon: Plantsain 5L/ha /semaine

2 fois 10L/ha de Tapis Vers à deux semaines d'intervalle si des galles sont observées en cours



Goutte à goutte



Programme Aubergines



> Préparation du terrain (si historique connu) :

Si problèmes de nématodes / insectes du sol (taupin) / maladies du sol :

Tapis Vers 20L/ha avant la culture

Si uniquement problèmes de maladies du sol : Plantsain 20L/ha avant la culture Puis Inoculation de Trichoderma avec Solsain 20L/ha avant la culture





Galles dues **Taupin** aux nématodes

Sur les mottes :

Solsain 20cL/10L par arrosage Favorise la croissance de la plante, la protège contre les maladies du sol, améliore la nutrition



Dernier arrosage avant plantation: Plantsain 5cL/10L

> A partir de la floraison :

Plantsain évite le bouchement des vaisseaux causé par les maladies du sol :



Verticilliose



Nécrose des racines



Sclerotinia



Fertisain stimule les défenses de la plante contre les maladies aériennes :



Oïdium



Mildiou



Botrytis



Phytophtora dahliae

Limosain favorise la reprise de la photosynthèse malgré les ravageurs :



Cochenilles





Aleurodes





Mouches des fruits









